

Trigestrel[®]

Levonorgestrel y Etinilestradiol Tabletas

INDICACION:

El Trigestrel[®] está usado para un control de natalidad a larga duración y una regulación de los ciclos menstruales mensuales.

CONTRAINDICACIONES:

El Trigestrel[®] no debe estar usado para las mujeres con algunas de las condiciones siguientes:

Embarazo conocido o posible, embolia pulmonar (en realidad o historia), enfermedad cardíaca de isquemia (en realidad o historia), Historia de los accidentes cerebrovasculares, una enfermedad valvular cardíaca con complicaciones, hipertensión Severa, diabetes con una implicación vascular, Dolores de cabeza con los síntomas neurológicos focales, cirugía principal con inmovilización prolongada, carcinoma de mama conocida o posible o una historia personal de cáncer de mama, tumores de Hígado (benigno y maligno) enfermedad activa de hígado, fumador empedernido (> 15 cigarrillos por día) y mayor de la edad de 35, Además, el uso se está contraindicando en las mujeres que son hipersensibles a alguno componente de este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Observe BP (presión arterial), los signos de edema/retención de fluido, y los signos de hemorragia intermenstrual /manchas de sangre.

USO EN LACTANCIA:

Los anticonceptivos orales se disuelven en la leche materna, y pueden disminuir su calidad y cantidad o reducir el tiempo de lactancia.

USO EN EMBARAZO:

La administración de Trigestrel[®] es contraindicada durante embarazo. Una combinación de los anticonceptivos orales no parece aumentar un riesgo de los efectos de nacimiento cuando está usada antes del embarazo. También se ha concluido de los estudios clínicos que los anticonceptivos orales tomados por descuido durante el embarazo temprano, no parece tener un defecto teratogénico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSA:

El Etinilestradiol Es un CYP3A3/4 Y 3^o5-7 sustrato de enzima; inhibidor de enzima de CYP1A2 se observa un efecto disminuido de los anticonceptivos orales con barbitúricos, hidantoínas, (fenitoina), rifampin, nefinavir, antibióticos (penicilinas, tetraciclinas), griseofulvina. Una toxicidad aumenta de acetaminofén, anticoagulantes, benzodiazepinas, cafeína, corticoides, metoprolol, teofilina, antidepresivos triciclitos interacciones de prueba

Disminuida antitrombina III, una concentración reducida de suero falato, aumenta protombina y los factores VII, VIII, IX, X, una agregabilidad aumentada de plaqueta, una globulina de enlace tiroidea aumentada hormona de tiroide (T4) y los niveles aumentados de suero triglicéridos/ fosfolípidos.

PRUEBA DE LABORATORIOS:

El uso de las precauciones como Trigestrel[®] puede influir los resultados de ciertas pruebas de laboratorios, bioquímico incluido, los parámetros de hígado, tiroides, una función suprarrenal y renal, los niveles de plasma (portador) de proteínas, p.ej una globulina de enlace corticoides y fracciones de lípido/lipoproteína, los parámetros de metabolismo de hidrato de carbono y los parámetros de coagulación y fibrinolisis. Cambios permanecen generalmente dentro del rango normal de laboratorio.

Reacción Adversa.

Las reacciones adversas siguientes han sido informadas en las mujeres que reciben los anticonceptivos orales y se cree que están relacionadas con la medicina: Hemorragia intermenstrual / manchas de sangre, retortijones, distendido, náuseas, vómitos, cambios en el flujo menstrual, amenorrea, edema, sensibilidad de mama, cambios en el peso o apetito, dolores de cabeza, cambios de humor, vaginitis, aumento en BP.

DOSIS Y ADMINISTRACION:

Se comienza las tabletas durante el primer día de la menstruación y deben estar tomadas diariamente sin interrupción mientras la anticoncepción sea deseada. Ellas deben estar tomadas al mismo tiempo cada día, preferiblemente después de la cena o a la hora de acostarse de modo que el intervalo entre tabletas siempre sea 24 horas aproximadamente. La protección puede reducir si el intervalo se aumenta más allá de 24 horas.

TABLETA OMITIDA:

Si se toma hasta 1 tableta tarde (es decir es mas de 27 horas desde el tiempo estuvo tomada la ultima tableta, es decir tres horas mas tarde que debe haber estado tomada) o si se olvida tomar 1 tableta, la protección contra la concepción puede ver perjudicada.

El usuario debe tomar la última tableta omitida lo más pronto como se recuerda ella, aun si lo significa tomando 2 tabletas al mismo tiempo. Entonces ella sigue tomando las Tabletass a su tiempo habitual.

Además, un método de barrera / protección debe estar usado para los próximos 7 días, si el coito ocurriera en los 7 días anteriores, la posibilidad de un embarazo debe ser considerada. Con una omisión de más tabletas, se aumenta un riesgo de un embarazo.

SOBREDOSIS:

No hubo ningunos informes de los serios efectos deletéreos de sobredosis.

FORMA DE PRESENTACION:

Envase en lámina de 21 Tabletass.

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a menos de 30C
Mantener alejado de los niños.

Elaborado por:
Famy Care Ltd