

# Profavit

Vitaminas y Minerales Prenatales

## COMPOSICIÓN

Cada cápsula blanda contiene:

Vitamin A (como Palmitato) (1700 000 UI/g)	2.35 mg
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	43.13 mg
Vitamina D (como Colecalciferol) (100 000 UI/g)	4.00 mg
Vitamina E (96% Tocoferol D-Alfa Acetato)	0.74 mg
Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1)	2.72 mg
Riboflavina (como Vitamina B2)	2.20 mg
Niacimida	11.00 mg
Piridoxina Hidrocloro (Vitamina B6)	2.68 mg
Ácido Fólico	0.30 mg
Vitamina B12 0.1 (como Cianocobalamina)	2.40 mg
D-Pantotenato de Calcio (como Ácido Pantoténico)	2.61 mg
Carbonato de Calcio	262.50 mg
Fumarato Ferroso	65.63 mg
Yoduro de Potasio 1%	6.00 mg
Sulfato de Magnesio	6.18 mg
Sulfato de Zinc	0.46 mg
Sulfato Cúprico	2.04 mg
Sulfato de Manganeso (32.1mn)	3.28 mg
Sulfato de Potasio	2.35 mg
Excipientes, c.s.p.	1 Cápsula

## MECANISMO DE ACCIÓN

Los componentes de la fórmula cumplen funciones metabólicas en los procesos bioquímicos en los que participan, como es servir de co-factores enzimáticos, agentes de reducción, inducción de la síntesis de aminoácidos, inducción de la síntesis proteica, facilitación del metabolismo de lípidos y carbohidratos, así como también como estimulación de la hematopoyesis y protección de defectos del tubo neural.

## FARMACODINAMIA Y FARMACOCINETICA

La farmacocinética de todos los componentes de la fórmula corresponde a la de sus componentes individuales, los cuales se absorben en el tracto gastrointestinal mediante transporte activo. No dependiente y saturable, en casos de sobrecarga de dosis, pudiendo ocurrir un proceso de transporte pasivo. Ocurriendo distribución tisular, saturación en los tejidos de reservas y posterior eliminación parcial o total por la orina, la bilis y las heces.

## CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en pacientes con alergia conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar en pacientes con hemocromatosis, hemosiderosis, anemia hemolítica, hipervitaminosis A y/o hipervitaminosis D, hipercalcemia e hipercalcemia, niños menores de 12 años.

## PRECAUCIONES GENERALES

Después de la administración oral o parenteral se puede presentar sensibilización alérgica a cualquiera de los componentes de las cápsulas. Suplevit Prenatal no está indicado para el tratamiento de la anemia perniciosa y no debe emplearse en pacientes con hipervitaminosis A y/o D, insuficiencia renal, hemosiderosis, hipercalcemia e hipercalcemia.

## USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

El hierro, las vitaminas y las sales minerales que contiene Suplevit Prenatal proveen suplementos requeridos durante el embarazo y la lactancia. Suplevit Prenatal es bien tolerado y las cápsulas se pueden tomar a cualquier hora, con o sin alimentos, sin que la absorción de sus componentes se vea afectada.

## REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Suplevit Prenatal es bien tolerado. En casos aislados

pueden presentarse rash o ligeros trastornos gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea, constipación).

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

No se recomienda el empleo concomitante de productos con hierro y tetraciclinas, ya que interfieren mutuamente con la absorción. Si se requiere, se deben administrar los 2 medicamentos de manera separada (se recomienda un intervalo de por lo menos 2 horas). Suplevit Prenatal no se debe administrar a pacientes con enfermedad de Parkinson bajo tratamiento con levodopa pura.

## ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

El ácido ascórbico es un agente reductor que interfiere con las pruebas de laboratorio basadas en reacciones de óxido reducción. Dosis elevadas de vitamina C pueden generar incrementos falsos en los niveles séricos de bilirrubina. El hierro es posible que interfiera con las pruebas de laboratorio para buscar sangre oculta en heces.

## PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y FERTILIDAD

Los preparados multivitamínicos son generalmente considerados como seguros por la FDA.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

## DOSIS

Una cápsula al día. Las cápsulas se pueden tomar con los alimentos.

## SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL

En caso de ingestión accidental o inadvertida de una dosis mayor a la recomendada, se debe consultar inmediatamente al médico.

## PRESENTACIÓN

Caja con 30 cápsulas softgels con sabor a chocolate.

## RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco debajo de 30°C.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Su venta requiere prescripción médica.

Elaborado por:

**Arnett Pharmaceuticals**  
2525 Davie Road, Suite # 330  
Davie Florida 33317, USA.

Para:

 **SUED & FARGESA**  
S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Reg. San. No.: RM2019-0288

® Marca registrada.

JCM/LBF2019



1600956