

# ProFazol-K

*Cada óvulo contiene:*

Ketoconazol 400 mg

*¿Cómo funciona?*

Tratamiento de infección micótica vaginal.

Está indicado para el tratamiento de la candidiasis vaginal aguda y crónica y vaginitis mixta.

Es usado también en la prevención de infecciones micóticas vaginales en mujeres con baja resistencia durante el tratamiento con antibióticos u otros fármacos que alteran la flora vaginal normal.

*Dosificación y administración:*

Un óvulo vaginal que debe ser insertado en la vagina una vez al día durante 3 ó 5 días consecutivos, lo más alto posible.



**Profamilia Oficinas Administrativas**  
Calle Socorro Sánchez No. 160, Gazcue, D. N.  
Tel.: 809- 689-0141 • Fax: 809- 686-8276

**Clínica Profamilia Evangelina Rodríguez**  
Av. Nicolás de Ovando, esq. calle 16 Norte,  
Santo Domingo  
Tel.: 809-684-3389

**Clínica Profamilia Herrera**  
Av. 27 de Febrero esquina Isabel Aguiar, 2do nivel  
Plaza Popular Herrera, Santo Domingo Oeste  
Tel.: 809-531-6161

**Clínica Profamilia Sabana Perdida**  
Av. Charles de Gaulle No. 46, Los Palmares,  
Sabana Perdida, Santo Domingo Norte  
Tel.: 809-239-4523 • Fax: 809-239-4525

**Clínica Profamilia Rosa Cisneros**  
Calle Restauración No. 161, Santiago  
Tel.: 809-582-7033

**Clínica Profamilia Camboya**  
Av. Primera No. 34, esq. Calle 1,  
Ensanche Gregorio Luperón, Camboya. Santiago  
Tel.: 809-575-4437

**Clínica Profamilia San Francisco de Macorís**  
Calle Padre Billini, No. 39 esq. Pedro Francisco Bonó,  
San Francisco de Macorís  
Tel.: 809-588-2376 • 809-244-5766

**Clínica Profamilia San Cristóbal**  
Av. Libertad No. 66, San Cristóbal  
Tel.: 809-528-8000

Visita nuestra página web [www.profamilia.org.do](http://www.profamilia.org.do)  
Síguenos en nuestras redes sociales @profamiliard



*Las Infecciones  
Vaginales*

## ¿Qué es una infección vaginal?

El término médico para inflamación vaginal es "vaginitis;" este puede ser causado por una infección.

Las 3 causas más comunes de las infecciones vaginales son las infecciones por hongos, la vaginosis bacteriana, y la tricomoniasis. Cada tipo de vaginitis es causado por un tipo diferente de germen u organismo y, por consiguiente, debe tratarse de manera diferente.

## Signos y síntomas de una infección vaginal

Si tienes una infección vaginal, puedes tener cualquier a de las cosas siguientes:

- Olor vaginal
- Picor vaginal
- Ardor vaginal
- Dolor o irritación al orinar o tener relaciones sexuales
- Secreción diferente de la normal



# Proclin-C

## Cada óvulo contiene:

Clindamicina 100 mg y Clotrimazol 200 mg

## ¿Cómo funciona?

Funciona inhibiendo el crecimiento de bacterias y hongos.

Los óvulos se utilizan para el tratamiento, control, prevención y mejoramiento de situaciones clínicas de los órganos reproductores femeninos y tejidos vaginal.

**Proclin-C** contiene Clindamicina más Clotrimazol en una formulación para administración vaginal en óvulos; son un agente antibacteriano y un antimicótico, especialmente diseñados para el tratamiento de las infecciones vaginales mixtas.

La Clindamicina es un derivado de la lincomicina con acción antibiótica contra diversas cepas de bacterias responsables de la vaginosis bacteriana.

## Dosificación y administración:

Un óvulo vaginal que debe ser insertado en la vagina una vez al día durante 5 días consecutivos, lo más alto posible.

# Proclin-K

## Cada óvulo contiene:

Clindamicina 100 mg y Ketoconazol 400 mg

## ¿Cómo funciona?

Tratamiento de la infección bacteriana y micótica vaginal.

**Proclin-K** contiene Clindamicina más Ketoconazol que tienen una acción antibacteriana y antimicótica; están especialmente diseñados para el tratamiento de las infecciones vaginales más frecuentes en mujeres, vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y la vaginitis mixta.

## Dosificación y administración:

Un óvulo vaginal que debe ser insertado en la vagina una vez al día durante 5 días consecutivos, lo más alto posible.

