


perla[®] (Oralcon-F)[®]

Levonorgestrel 0.15 mg - Etinilestradiol 0.03 mg



Perla (Levodiol marca registrada (levonorgestrel, etinilestradiol) comprimidos
Instrucciones para el uso de Levodiol en comprimidos junto con comprimidos de fumarato ferroso.
Este producto solo debe usarse bajo la supervisión de un médico o profesional sanitario.

CAJA

Esta caja contiene 28 comprimidos

INDICACIONES

Levodiol en comprimidos está indicado para la prevención del embarazo.

PRIMERA CAJA

Si está empezando a usar píldoras orales combinadas ("la píldora") por primera vez, espere a su próxima regla para comenzar (este es el "Día uno", el primer día de su sangrado menstrual. La toma de comprimidos debe comenzar el Día uno. Se permite comenzar en los días 2 a 7 (por ej. comenzar el domingo), pero se recomienda usar un método anticonceptivo hormonal de apoyo (como condones y espermicidas) durante los primeros 7 días de la toma de los comprimidos durante el primer ciclo. El día uno de su regla, abra el envase alveolado donde aparece la flecha y tome la primera píldora. Después de la primera píldora siga la fila, tomando una píldora todos los días hasta terminarel envase. Es mejor tomar su píldora a la misma hora todos los días, preferentemente con una comida o antes de irse a la cama.

Nota: Durante el primer ciclo no debe confiarse en el método anticonceptivo de este producto hasta después de tomar las primeras 7 píldoras blancas. Debe utilizarse un método anticonceptivo complementario (no tabletas anticonceptivas orales; por ejemplo, de barrera) hasta que se hayan tomado las primeras 7 píldoras blancas para asegurarse de que está protegida contra un embarazo.

COMO CONTINUAR

Después de terminar el primer paquete comience el nuevo paquete al día siguiente. Como antes comience con la píldora situada junto a la flecha. Luego continúe tomando un comprimido diario, siguiendo la dirección de la línea como antes aunque aún siga menstruando.

TABLETAS OMITIDAS

Levodiol en comprimidos está diseñado para protegerla del embarazo, pero sólo lo hará siempre que usted siga el esquema cuidadosamente. Sin embargo, si olvidara de tomar 1 ó más píldoras blancas, o si comienza tarde una caja. Su cuerpo no podría tener las sustancias suficientemente necesarias para evitar el embarazo. **En tales casos, use un método anticonceptivo complementario (que no sean tabletas anticonceptivas orales, por ejemplo, de barrera) hasta que haya tomado una píldora blanca durante 7 días consecutivos o hasta que haya tomado todas las píldoras blancas si le quedan menos de 7 en el paquete.**

SI SE SALTA UNA REGLA

Una ausencia de regla raramente significa embarazo siempre que haya seguido el esquema, en ocasiones una menstruación deja de presentarse con todos los anticonceptivos orales, aún cuando haya tomado sus tabletas con regularidad, si se saltaron un período consulte a su médico o profesional sanitario antes de comenzar la caja siguiente. Después de que haya tomado las 21 píldoras blancas generalmente comenzará a menstruar unos días después que será durante el momento en que esté tomando las píldoras marrones. Si ha omitido una píldora o comenzado tarde una caja y no menstruó en 7 días, visite un médico o profesional sanitario. Suspenda el producto hasta que le digan que lo vuelva a usar. **Use un método alternativo de anticoncepción (que no sean tabletas anticonceptivas orales, por ejemplo, de barrera) hasta que se descarte un embarazo.**

EFFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES

(Período de ajuste a Levodiol comprimidos) la mayoría de los efectos secundarios de la píldora no son graves y generalmente solo ocurren durante los primeros meses de uso mientras su cuerpo se ajusta. Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos, sangrado entre períodos menstruales, aumento de peso y sensibilidad al tacto en las mamas. Sin embargo otros efectos secundarios son muy graves. Estos efectos secundarios graves son: coágulos de sangre en las piernas, pulmones, cerebro, corazón u otros órganos y hemorragia intensa; hipertensión arterial; enfermedades de la vesícula biliar, infarto de miocardio o dolor en el pecho, apoplejía, cáncer cervical y que le diagnostiquen cáncer de mama. Los síntomas asociados con estos efectos secundarios graves se enumeran a continuación bajo ADVERTENCIA

ADVERTENCIA (Cuando consultar a su médico)

Deje de tomar los comprimidos y visite inmediatamente a su médico si tiene dolor en las piernas, el pecho o el abdomen, dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso o vómitos, mareos o desmayos, dificultad para ver o hablar, sensación de debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna, si tose con sangre, si nota sangrado vaginal inesperado cambios en su período menstrual, si se pone muy triste o irritable, o tiene otros síntomas inusuales. Si tiene o ha tenido un problema de salud grave, tales como migraña, depresión mental, fibroides en el útero, cardiopatía o nefropatía, asma, hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, lesiones oculares (cataratas) enfermedad de la vesícula biliar o ictericia, infórmeselo a su médico.

Fumar cigarrillo aumenta el riesgo de efectos secundarios graves sobre el corazón y los vasos sanguíneos, por el uso de anticonceptivos orales. Este riesgo aumenta con la edad y con fumar mucho (15 ó más cigarrillos por día) y es muy marcado en mujeres de más de 35 años de edad. Las mujeres que toman anticonceptivos orales no deben fumar.

ANTES DE COMENZAR A TOMAR LEVODIOL EN COMPRIMIDOS

Comentele al médico o profesional sanitario si está tomando un fármaco o medicamento. Después de comenzar si necesita cualquier tipo de medicamento (ya sea recetado por su médico o obtenido sin receta), asegúrese de decírselo a su médico. Esto es importante porque algunos medicamentos podrían interferir con la acción de este producto. Además, cuando acuda a su médico o ambulatorio por cualquier razón, mencione que está tomando anticonceptivos orales. Si contrae una enfermedad con vómitos y diarrea que dura más de 24 horas mientras está tomando este producto, podría reducirse su protección. En tal caso continúe tomando los comprimidos use también un método anticonceptivo complementario (por ejemplo de barrera), hasta el final de este ciclo.

CONTRAINDICACIONES (Quiénes no deben tomar anticonceptivos orales)

Las mujeres que tienen o han tenido uno de los siguientes trastornos no deben usar la píldora: coágulos sanguíneos en las piernas, pulmones, ojos u otras partes; infarto de miocardio o apoplejía; angina de pecho; sospecha o confirmación de cáncer de mama u otro cáncer de los órganos reproductores; sangrado vaginal inusual que aún no ha sido diagnosticado; ictericia u otra enfermedad hepática o tumores hepáticos benignos o malignos (mientras la función hepática no regrese a lo normal); neoplasias estrogénoddependientes; embarazo conocido o sospechado; tromboflebitis o trastornos tromboembólicos; trastornos cerebrovasculares; valvopatías trombotogénicas y trastornos trombotogénicos; trastornos trombotogénicos del ritmo; hipertensión incontrolada; lesión ocular que surge de una vasculopatía oftálmica tal como la pérdida completa o parcial de la visión o un defecto en el campo visual; diabetes con compromiso vascular; alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de levodiol comprimidos (levonorgestrel y etinilestradiol)

Estas instrucciones proporcionan información sobre el uso correcto y los riesgos conocidos de este producto. Hable con su médico o consejero de salud si tiene alguna duda.

